HAZAI GESZTENYEFAJTÁK

Nagymarosi 22

Délkeleti száraz fekvésben, kötött agyagtalajon kialakult fajta. Közepes növésű, gömb alakú koronát nevel. Igen bőtermő, a hajtások 44%-án átlagosan 1,3 kupacsot hoz. A legkorábbi érésű, érése szeptember végén kezdődik. Igen nagy gyümölcsű (12,4 cm3), legnagyobb átmérője 39,8 mm. Kupacsaiban átlagosan 2,1 makk van, 18%-ban gömbölyded, 71%-ban egy oldalon lapított. Tetszetős világos, sima és vékony héjú, viszonylag nagy pecséttel
(a makk kupacshoz csatlakozó parásodott része). íze édes, aromás, húsa halványsárga. A gyümölcs jól tárolható.

Száraz, melegebb déli fekvésben — jó termőerejű talajon termeszthető. Igen korai érése előnyösen érvényesül a piaci előszezonban és a betakarítási munkacsúcs széthúzásában. Koraisága kiváló áruminőséggel párosul.

Nagymarosi 37

Északi fekvésben kötött talajon kialakult fajta. Erős növekedésű magasra törekvő koronaalakkal. Bőtermő, a hajtások 51%-án átlagosan 1,5 kupacsot hoz. Kései érésű, érés ideje október közepén kezdődik. Nagy gyümölcsű (10,8 cm3), legnagyobb átmérője 38 mm. Kupacsaiban átlagosan 1,6 makk van, 13%-ban gömbölyded, 68%-ban egyoldali lapított. A makkja jellegzetesen kúposodó. Héja egyenletesen világosbarna, finom szerkezetű, jól hámozható. Íze telt gesztenyeíz, húsa barnássárga. A gyümölcs igen jól tárolható. Kiegyenlített, hűvös fekvésben jó tápanyagellátottságú talajra telepíthető. Kései érése, jó tárolhatósága értékesítésének időtartamát hosszabbítja.

Nagymarosi 38

Északi fekvésben, kötött talajon kialakult fajta, közepesen erős növekedésű. Rendszeresen, bőven terem. A hajtások 42%-a átlagosan 1,6 kupacsot hoz. Közepes érésű, érése október elején kezdődik, lefolyása gyors. Nagy gyümölcsű (11,3 cm3), legnagyobb átmérője 37,8 mm. Kupacsaiban átlagosan 1,8 makk van, 76%-ban egyoldalt lapított. Barnássárga héja sötéten csíkozott, tetszetős. A héj fényes, nem bordázott, viszonylag nagy pecséttel. Héja finom szerkezetű, vékony, könnyen hámozható. Íze telt gesztenyeíz, húsa világossárga. A gyümölcs jól tárolható.

Kiegyenlített hűvösebb fekvésben, mélyrétegű talajon termeszthető. Értéke a Nagymarosi 37 fajtához hasonló, de korábbi érésű, azzal együtt telepíthető.

Kőszegszerdahelyi 2

Délkeleti fekvésben, kristályos pala alapkőzeten álló köves, fakó erdőtalajon kialakult fajta. Közepes növésű, sátorozó koronát nevel. Levélzete jellegzetesen vastag, bőrszerű. Bőtermő, a hajtások 53%-án átlagosan 1,2 kupacsot hoz. Közepes érésű, érése október közepén kezdődik. Igen nagy gyümölcsű (12,6 cm3), legnagyobb átmérője 37,2 mm. Kupacsaiban átlagosan 1,3 39%-ban gömbölyded, 57%-ban egy oldalt lapított makk van.

Sötét barnás héja tetszetős fényes, közepesen vastag, íze telt, húsa világosbarna. Hegyvidéki termőhelyen telepíthető. Kiváló áruminőséget ad.

Kőszegszerdahelyi 29

Délkeleti fekvésben kristályos pala alapkőzeten álló köves, fakó erdőtalajon kialakult fajta. Erős növésű, szétterülő koronát nevel. Rendszeresen, igen bőven terem, a hajtások 80%-án hoz átlagosan 1,6 kupacsot. Középkései érésű, érése október közepén kezdődik, pár nappal később mint a Kőszegszerdahelyi 2. Közepes gyümölcsméretű (9,8 cm3), legnagyobb átmérője 36,7 mm. Kupacsaiban átlagosan 1,6 21%-ban gömbölyded, 67%-ban egyoldali lapított makk van. Sárgásbarna héja közepesen vastag, jól hámozható. Íze édeskés, húsa sárgásbarna.

Hegyvidéki termesztőhelyen telepíthető, értéke a rendszeres nagy termőképessége.

Iharosberényi 2

Dél-dunántúli lösztalajon kialakult fajta. Erős növésű, szétterülő koronát nevel. Bőven terem, a hajtások 52%-án hoz átlagosan 1,9 kupacsot. Korai érésű, érése október elején — néha már szeptember végén kezdődik, lefolyása gyors. Igen nagy gyümölcsű (12 cm3), legnagyobb átmérője 37,9 mm. Kupacsaiban átlagosan 2,2 24%-ban gömbölyded, 70%-ban egyoldalt lapított makk van. Sötétbarna, erős héjú, intenzív aromájú, a hazai ízlésnek megfelelő gesztenyeíz. Húsa világosbarna.

Korai érésű, a termékeny lösztalajokon kiváló áruminőséget adó fajta.

Iharosberényi 29

Dél-dunántúli lösztalajon kialakult fajta. Középerős növekedésű, terebélyes koronát nevel. Igen bőven terem, a hajtások 46%-án hoz átlagosan 2 kupacsot. Kései érésű, érése október utolsó harmadára esik. Igen nagy gyümölcsű (11,4 cm3). Kupacsaiban átlagosan 2,3 8%-ban gömbölyded, 76%-ban egyoldalt lapított makk van. Héja barna, felülete sima, fényes, közepesen vastag, jól hámozható. íze intenzív aromájú, húsa világosbarna.

Kései érésével a szedés és értékesítés nyújtható. Termékeny lösztalajon nagy hozamot és jó áruminőséget képes adni.

Iharosberényi 57

Dunántúli lösztalajon kialakult fajta. Rendszeresen és bőven terem, a hajtások 44%-án hoz átlagosan 2 kupacsot.

Közepes érésű, érése október elején kezdődik, lefolyása igen hosszú. Nagy gyümölcsű, legnagyobb átmérője 34 mm. Kupacsaiban átlagosan 2,4 10%-ban gömbölyded, 84%-ban kissé lapított makk van. Héja világosbarna, felülete kissé hullámos, pecsétje nagy, szabálytalan, íze az Iharosberényi fajtákra jellemző, erősen aromás, húsa sárgásbarna. A leghosszabb érésű fajta, termékeny lösztalajon rendszeresen, bőven terem.

Forrásként szolgált:

Dr. Szentiványi Péter - Gesztenye - Mezőgazdasági Könyvkiadó -